

# 黄耆建中湯 (おうぎけんちゅうとう)

内服

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 分類                       | 漢方薬  |
| 一般名                      | シャクヤク等 (下欄参照)  |
| 効果・<br>効能                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・虚弱体質、病後の衰弱、ねあせなどに使う薬です。</li> </ul>   |
| 気をつ<br>けてほ<br>しい副<br>作用  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・汗を多くかいている時には、この薬の服用により血液中のカリウムが低くなり、異常なむくみや血圧上昇がおきることがあります。【グリチルリチンは、この副作用をさらに増強することがありますので、併用には注意が必要です。】</li> </ul>                   |
| ほかに<br>注意し<br>てほし<br>いこと | <ul style="list-style-type: none"> <li>・漢方薬は、一般に食前や食間などの空腹時に服用していただきますが、食後でも効果はさほど変わりません。また、漢方薬は湿気やすいので、注意して下さい。</li> <li>・成分：シャクヤク、オウギ、ケイヒ、タイソウ、カンゾウ、シヨウキョウ【ツムラ98】</li> </ul> |
| メーカー                     | (株) ツムラ  |

●お薬のことで分からないことや心配なことがありましたら、医師や職員にお伝え下さい。

2015/01